

MÉDICO PEDIATRA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno **APENAS** para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Para viajar basta existir.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no item 9.3.11. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.fhemig.mg.gov.br> no dia 26 de julho de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **60 (sessenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de **Saúde Pública** e 45 (quarenta e cinco) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

A Constituição Federal de 1988 prevê **atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.**

O texto em destaque pode ser compreendido como:

- A) Atendimento, em todos os níveis de complexidade, considerando o indivíduo como um todo, com prioridades para as ações de vacinação, atividades de promoção à saúde, sem prejuízo dos atendimentos hospitalares.
- B) Atendimento, em todos os níveis de complexidade, considerando o indivíduo como um todo, com prioridades para os atendimentos hospitalares, tendo em vista a urgência / emergência dos casos, sem prejuízo das ações de promoção à saúde.
- C) Atendimento a todos os indivíduos, sem distinção de sexo, cor, raça, com prioridades para as ações de vacinação e atividades de promoção à saúde, sem prejuízo dos atendimentos hospitalares.
- D) Atendimento a todos os indivíduos, sem distinção de sexo, cor, raça, com prioridades para os atendimentos hospitalares, tendo em vista a urgência / emergência dos casos, sem prejuízo das ações de promoção à saúde.

QUESTÃO 2

Analise as afirmativas a seguir sobre prevenção de doenças, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Existem quatro níveis de prevenção às doenças, correspondentes a diferentes fases do desenvolvimento delas: primordial, primário, secundário e tratamento especializado.
- () Todas as formas de prevenção são importantes e complementares. Entretanto, as formas de prevenção primordial e primária têm maior impacto sobre a saúde das populações, enquanto os níveis de prevenção secundária e terciária são geralmente focados nas pessoas, visto que estas já possuem os sinais de doença.
- () O objetivo da prevenção secundária é reduzir as consequências mais graves da doença através do diagnóstico precoce e do tratamento, por exemplo: testes de visão e audição em crianças em fase escolar.
- () Ações que incluam todos os níveis de prevenção são importantes por apresentarem elevado impacto sobre a saúde das populações e por reduzirem os custos hospitalares relacionados ao tratamento e reabilitação.


Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V V

QUESTÃO 3

Observe o gráfico a seguir, extraído do IBGE.

Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos – Brasil – 2000 a 2015



IBGE. PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DO BRASIL – 2013.

Sobre o gráfico e de acordo com seu conhecimento a respeito da mortalidade infantil no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O coeficiente (ou taxa) de mortalidade infantil é comumente utilizado como um indicador do nível de saúde de uma comunidade.
- B) A taxa de mortalidade infantil mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida, dividido pela população total no mesmo ano.
- C) O coeficiente de mortalidade infantil é particularmente sensível a mudanças socioeconômicas e a intervenções na saúde.
- D) O coeficiente de mortalidade infantil apresentou queda contínua durante o período de 2000 a 2015.

QUESTÃO 4

Analise as afirmativas a seguir, que se referem à taxa de mortalidade materna.

- I. A taxa de mortalidade materna refere-se ao risco de morte materna em decorrência de causas associadas a complicações durante a gestação, parto e puerpério.
- II. A taxa de mortalidade materna reflete uma importante estatística frequentemente negligenciada devido à dificuldade para calculá-la de forma precisa.
- III. A taxa de mortalidade materna é calculada dividindo-se o número de óbitos maternos relacionados a gestação, parto e puerpério em um ano pelo total de nascidos vivos durante o mesmo ano X 100 000.


Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 5

Observe o gráfico a seguir do IBGE.

Taxa bruta de mortalidade por mil habitantes – Brasil – 2000 a 2015



Sobre a taxa bruta de mortalidade, apresentada nesse gráfico, considere as afirmativas a seguir.

- I. A principal desvantagem da taxa de mortalidade geral é o fato de não considerar que o risco de morrer varia conforme sexo, idade, raça, classe social, entre outros fatores.
- II. Não se deve utilizar o coeficiente de mortalidade geral para comparar diferentes períodos de tempo ou diferentes áreas geográficas.
- III. Quando se compara o coeficiente de mortalidade entre grupos com diferente estrutura etária, deve-se utilizar coeficientes padronizados.

Sobre o indicador taxa bruta de mortalidade, é **correto** o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 6

Leia o resumo do artigo *Perfil de morbidade hospitalar de pacientes pediátricos de 5 a 9 anos por causas sensíveis à Atenção Primária à Saúde nas cinco principais capitais brasileiras*.

“Identificar as principais causas de hospitalizações de crianças auxilia na percepção do perfil de adoecimento e na estratégia para elaboração de planos de atenção à saúde para prevenir o agravamento das doenças e diminuir o número de internações hospitalares.

Objetivos: Obter, através de dados oficiais, informações sobre as principais causas de hospitalização em crianças de cinco a nove anos, para elaborar um perfil das principais doenças que têm levado à hospitalização no Brasil.

Métodos: Pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, exploratória e inferencial, cujos dados foram obtidos através do *site* do DATASUS, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2012.

Resultados: Indicam uma distribuição heterogênea da morbidade entre as regiões pesquisadas, apresentando como a primeira causa de internação hospitalar em crianças de cinco a nove anos, as doenças do aparelho

respiratório, seguido de doenças infecciosas do aparelho gastrointestinal e da pele e subcutâneo. Os dados demonstram a maneira que os serviços de saúde podem se organizar para implementar a integralidade na atenção à saúde para a faixa etária em questão, priorizando a atenção primária, na prevenção dos agravos das doenças do aparelho respiratório e das infecções do aparelho gastrointestinal, da pele e subcutâneo. As doenças citadas fazem parte das doenças cujo acometimento se dá por causas sensíveis à atenção ambulatorial e podem ser evitadas e / ou minimizadas por intervenções no âmbito da Atenção Primária à Saúde.”

FARNESE, J. M.; SÁ, M.B.; BARBOSA, L. A. R. R. *et al.* Perfil de morbidade hospitalar de pacientes pediátricos de 5 a 9 anos por causas sensíveis à atenção primária à saúde nas cinco principais capitais brasileiras. *Revista Eletrônica Gestão & Saúde*. V 06, N° 02, Ano 2015. p. 1 495-14.

Sobre as medidas utilizadas para caracterizar as doenças citadas no texto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Elevadas taxas de morbidade são sempre proporcionais às taxas de mortalidade.
- B) Dados de morbidade podem refletir a prevalência das doenças em determinada localidade.
- C) Dados de morbidade podem ser úteis para se avaliar a qualidade da assistência prestada em diferentes níveis de assistência à saúde.
- D) As taxas de mortalidade poderiam ter sido utilizadas em detrimento dos dados de morbidade, uma vez que são particularmente úteis na investigação de doenças com alta letalidade.

QUESTÃO 7

De acordo com o Artigo 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

De que forma as instituições privadas podem participar do SUS?

- A) De forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- B) De forma competitiva, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- C) De forma complementar, mediante acordo entre ambas as partes, tendo preferência as entidades compostas por sociedades anônimas.
- D) De forma competitiva, mediante acordo entre ambas as partes, tendo preferência as entidades compostas por sociedades anônimas.

QUESTÃO 8

As taxas de internações hospitalares podem ser influenciadas por diversos fatores, **EXCETO**:

- A) fatores ecológicos.
- B) morbidade hospitalar.
- C) disponibilidade de leitos.
- D) políticas de admissão hospitalar.

QUESTÃO 9

O setor de bens e serviços de saúde necessita, em maior ou menor grau, de regulação governamental devido às suas características:

- I. Existe uma dissociação entre consumidor final e agente responsável pela indicação terapêutica. De forma geral, o consumidor não tem capacidade de reconhecer sua necessidade e o prescritor pode ser influenciado pela preocupação de que o paciente utilize seus serviços.
- II. O setor de bens e serviços de saúde são bens credenciais, isto é, necessitam de certificação pública reconhecida ou, na ausência desta, a reputação do provedor do bem, ou serviço, passa a ser relevante, tanto nas decisões de consumo quanto na prescrição feita pelos profissionais de saúde. De certa forma, esse ponto corresponde à falta de circulação e suficiência de informação no mercado.
- III. Elevados gastos (para alguns produtos) em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos sendo necessária a regulação de seus preços.

Sobre esse mercado, estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 10

Em relação à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e à sua utilização pelo usuário no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É garantida pela Lei Nº 8.142, de 1990.
- B) Deve ser restrita aos usuários do Sistema de Saúde.
- C) É garantida pela Lei Nº 8.080/1990 e pelo decreto Nº 7.508/2011, que o regulamenta.
- D) Deve ser vetada, uma vez que a divulgação das informações incorre em aumento da demanda aos serviços de saúde.

QUESTÃO 11

O acesso ao Sistema de Saúde Público é direcionado a(à):

- A) toda população.
- B) população que paga impostos.
- C) população com carteira assinada e seus dependentes.
- D) população que não tem condições de arcar com os custos do sistema de saúde privado.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei Nº 8.080, de 1990), estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Sobre a assistência terapêutica mencionada, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** seus aspectos regulamentares.

- A) Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
- B) Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, aprovados para comercialização no país pelo órgão de vigilância sanitária.
- C) Oferta de procedimentos biológicos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
- D) Oferta de procedimentos biológicos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, aprovados para comercialização no país pelo órgão de vigilância sanitária.

QUESTÃO 13

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é um instrumento de:

- A) controle social.
- B) registro econômico.
- C) controle demográfico.
- D) registro demográfico.

QUESTÃO 14

O atendimento a crianças em um setor de urgência e emergência de um serviço público deve ser:

- A) gratuito para aquelas crianças cujos pais não têm condições para arcar com os custos.
- B) gratuito para todas as crianças, independentemente da situação socioeconômica.
- C) pago com recursos de três fontes distintas (Estado + empresa + indivíduo).
- D) pago pelo convênio de saúde dos pais.

QUESTÃO 15

De acordo com o Art. 17 da Lei Orgânica da Saúde, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

- I. acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);
- II. identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
- III. estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde.

Estão **corretas** as competências:

- A) I e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Sobre a anemia falciforme, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A esplenomegalia encontra-se presente ao longo de toda a vida do paciente.
- B) A anemia falciforme é caracterizada pela presença de hemoglobina SS nas hemácias.
- C) As principais causas de morbi-mortalidade associada à doença são resultados de anemia hemolítica, vasclusão microvascular difusa e infecções graves e repetidas.
- D) A antibioticoprofilaxia com penicilina está indicada até a idade de pelo menos cinco anos como forma de reduzir a letalidade provocada pelas infecções.

QUESTÃO 17

Analise as afirmativas a seguir sobre crise aguda de asma na infância e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () São fatores de risco para asma grave uso de broncodilatadores de longa duração, pico de fluxo expiratório < que 50% do melhor registro conhecido do paciente e uso de betabloqueadores.
- () O escore clínico de Downs e Wood no valor de 6 representa que a criança apresenta uma crise grave e falência respiratória bem estabelecida.
- () Nos casos de intubação por asma grave e necessidade de ventilação mecânica, deve-se utilizar de pressão positiva no final da expiração – PEEP elevadas em torno de 7 ou 8 no intuito de fazer o recrutamento alveolar.
- () Deve-se considerar o uso de β_2 venoso se não houver melhora após uso inalatório na dose inicial 1 mcg/kg/min de salbutamol.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 18

Sobre o crescimento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A velocidade de crescimento é de cerca de 20 a 25 cm no 1º ano de vida.
- B) O término do crescimento estatural ocorre por ação dos estrógenos na cartilagem de crescimento, em ambos os sexos, promovendo o seu fechamento.
- C) A tireoide é considerada a glândula central da regulação do crescimento.
- D) Durante o estirão puberal, a velocidade de crescimento pode chegar a 12 cm ao ano.

QUESTÃO 19

Sobre as bronquiolites viróticas na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Por ser uma doença de grande morbidade, recomenda-se a realização de exames laboratoriais ou radiográficos rotineiramente.
- B) Pode haver coinfeção viral em 6 a 30% dos casos.
- C) Suplementar O_2 se saturação estiver abaixo de 92% em ar ambiente.
- D) Não se deve utilizar β_2 -agonista venoso ou corticoide, uma vez que não existe respaldo científico para uso.

QUESTÃO 20

Associe a COLUNA I com a COLUNA II, relacionando os agentes etiológicos das pneumonias comunitárias na infância com seus respectivos tratamentos.

COLUNA I

1. *Streptococcus pneumoniae*
2. *Moraxella catarrhalis*
3. *Staphylococcus aureus*
4. Micoplasma

COLUNA II

- () Oxacilina por 14 a 21 dias
- () Penicilina por 7 a 10 dias
- () Penicilina mais inibidor da betalactamase
- () Macrolídeo por 14 dias

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 4 1
- B) 4 2 3 1
- C) 4 3 2 1
- D) 3 1 2 4

QUESTÃO 21

Sobre a cetoacidose diabética na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Laboratorialmente, caracteriza-se por uma glicemia > 200 mg/dl, associada à glicosúria, pH venoso < 7,25 ou arterial < 7,3 e / ou HCO_3^- < 15 mmol/l e presença de Cetonemia > 3 mmol/l, associada a cetonúria.
- B) Caracteriza-se clinicamente pela falta absoluta ou relativa de insulina, hiperglicemia, desidratação, perda de eletrólitos, acidose metabólica e cetose.
- C) A tríade clássica do *diabetes mellitus* tipo 1 é composta por poliúria, oligodipsia e polifagia levando a um aumento do peso.
- D) Os principais fatores precipitantes são as infecções em 30 a 40% dos casos.

QUESTÃO 22

Sobre as doenças diarreicas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A diarreia aguda tem duração igual ou inferior a 14 dias.
- B) A diarreia osmótica ocorre quando o conteúdo da luz intestinal exerce uma força osmótica em relação ao meio interno.
- C) Trabalhos experimentais demonstraram que a proteína NSP4 do rotavírus induz à diarreia do tipo secretor, sendo, então, considerada a primeira toxina viral descrita.
- D) A *E. coli enterotoxigenica* (ECET) é altamente prevalente em países em desenvolvimento, sendo que em 5 a 10% dos surtos evolue como síndrome hemolítico-urêmica – SHU.

QUESTÃO 23

Sobre a intubação em sequência rápida (SRI) em pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Intubação em sequência rápida (SRI) é uma técnica de intubação traqueal para situações de emergência em que a sedação farmacológica e paralisia são induzidas em rápida sucessão para realizar com rapidez e eficácia a laringoscopia e a intubação traqueal com mínimos riscos.
- B) A SRI está indicada também para pacientes em parada cardíaca ou para aqueles que estão profundamente comatosos.
- C) Em situações de emergência, o paciente pode se encontrar em diversos graus de consciência e sempre se considera que esteja com estômago cheio.
- D) A pré-oxigenação é particularmente importante em crianças cuja demanda por oxigênio é maior e o volume residual nos alvéolos é menor que nos adultos, devendo ser feita com oxigênio a 100% por 3 minutos.

QUESTÃO 24

Analise as seguintes afirmativas sobre convulsões no recém-nascido e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Devido à imaturidade cerebral, pode haver padrões diferenciados de crises, sendo comuns as crises sutis e a ausência de crises tônico-clônicas generalizadas.
- () A lidocaína pode ser utilizada como tratamento de segunda linha nas convulsões neonatais.
- () O EEG interictal normal habitualmente está associado com um mau prognóstico neurológico.
- () Nos casos de crise convulsiva secundária à hipoglicemia, deve-se corrigir o distúrbio metabólico com solução de glicose a 10% na dose de 2 mg/kg por via endovenosa.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 25

Sobre a coqueluche na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A leucocitose com linfocitose pode acompanhar em intensidade a gravidade do quadro.
- B) Na terceira semana de evolução, surge a tosse característica, em guincho, com acessos paroxísticos que podem durar até 3 meses.
- C) O período de incubação é de 7 a 10 dias, no máximo 21 dias.
- D) O principal benefício da antibioticoterapia é a redução do período de contagiosidade para 5 dias.

QUESTÃO 26

Sobre a dengue, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na criança, o agravamento, em geral, é mais lento do que ocorre no adulto, e os sinais de alarme são mais facilmente detectados.
- B) A maior parte dos casos graves ocorre pelo extravasamento plasmático.
- C) Podem ocorrer três fases clínicas, a saber: febril, crítica e de recuperação.
- D) O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido, ocorrendo geralmente entre os dias quatro ou cinco de doença.

QUESTÃO 27

Analise o caso clínico a seguir.

Escolar de seis anos e seis meses de idade, sexo masculino, foi internado devido a quadro de inapetência, cansaço e chieira. Feito uso do tratamento de suporte e medicamentos e, mesmo assim, o paciente apresentou piora clínica com certa sonolência e dificuldade de aceitação pela via oral. Exame físico: sibilos e crepitações difusas bilaterais. Exames laboratoriais: radiografia de tórax demonstrando retificação de cúpulas diafragmáticas e ar retroesternal, sem condensações relevantes. Apresenta saturação de 91%. Na gasometria, apresenta PaCO₂ de 55 mmHg.

Sobre o caso clínico anterior, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve-se colocar oxigênio suplementar.
- B) O corticoide venoso está indicado.
- C) Se não houver melhora com beta-2 inalatório e ipratrópio, pode ser administrado o sulfato de magnésio em 20 a 30 minutos.
- D) Não existe indicação de CTI, uma vez que o paciente apresenta saturação de 91%.

QUESTÃO 28

Sobre a púrpura trombocitopênica imune (PTI), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A hemorragia gastrointestinal é a principal causa de morte na PTI infantil.
- B) A PTI é uma doença imunomediada, em que as plaquetas são opsonizadas por autoanticorpos e destruídas pelos fagócitos do sistema reticuloendotelial.
- C) A resolução espontânea do quadro ocorre entre 80-85% dos casos.
- D) O mielograma está indicado nos casos em que a terapêutica com corticoide estiver sendo considerada.

QUESTÃO 29

Analise o caso clínico a seguir.

Pré-adolescente, sexo feminino, foi internada com quadro de poliúria, dor abdominal e cansaço. Exame físico: hiperpneia e taquipneia sem ruídos adventícios. Exames laboratoriais: glicemia de 340 mg/dl, na gasometria apresenta pH de 7,23 com bicarbonato de 14 mmol/L. Presença de cetonas na urina.

Sobre o caso clínico anterior, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Como primeiro passo de tratamento, deve-se iniciar hidratação venosa com soro fisiológico 0,9%.
- B) Por estar em acidose metabólica, deve-se administrar obrigatoriamente o bicarbonato.
- C) Essa paciente deve obrigatoriamente ter dois acessos venosos para controle de seu quadro clínico.
- D) O segundo passo a ser adotado é o uso de insulina por via endovenosa.

QUESTÃO 30

Sobre a anemia ferropriva, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A anemia ferropriva tem alta prevalência entre os adolescentes.
- B) Valores de *red cell distribution width* (RDW) em torno de 10 a 14% são altamente sugestivos de anemia ferropriva.
- C) Manifestações precoces da deficiência de ferro podem surgir antes do aparecimento da anemia, como queda na curva de peso, redução na capacidade de atenção e déficits psicomotores.
- D) O tratamento medicamentoso da anemia ferropriva não proporciona uma resposta imediata nos níveis de hemoglobina.

QUESTÃO 31

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de dois meses de idade, sexo feminino, foi internada devido a quadro de hipotermia, vômitos, irritabilidade, convulsões. Ao exame, observa-se apneia e fontanela abaulada. Exames realizados: leucócitos de 22 000/mm³, hemoglobina 9,2 g/dl e plaquetas de 32 000/mm³.

Considerando esse caso clínico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Se houver instabilidade clínica ou sinais de encefalite, deve-se iniciar aciclovir.
- B) O tratamento de escolha é com ceftriaxona – 100 mg/kg/dia de 12/12h.
- C) Deve-se realizar a punção lombar imediatamente tendo em vista ser um quadro provável meningite.
- D) A dexametasona deve ser utilizada antes da dose do antibiótico.

QUESTÃO 32

Pré-escolar de dois anos e seis meses de idade, sexo masculino, foi internado com quadro de pneumonia bilateral e vem apresentando piora mesmo com uso de antibiótico-terapia; no momento, apresenta-se com oligúria, taquidispneia, enchimento capilar maior que dois segundos, pulsos periféricos impalpáveis e extremidades frias.

Considerando esse caso clínico, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Se o paciente estiver hipotenso após reparação, deve-se administrar dobutamina na dose de 10 mcg/kg/min.
- () A primeira conduta a ser adotada é a administração de NaCl 0,9% na dose de 20 mL/kg em 5 a 10 minutos.
- () Nos casos refratários, deve-se avaliar a possibilidade de pneumotórax, tamponamento cardíaco ou emergência endócrina.
- () A hemotransfusão deve ser feita somente se a hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 33

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de dois anos e seis meses de idade, sexo feminino, foi internada devido a quadro de perda súbita de consciência, seguida de contração tônica generalizada e, posteriormente, surgimento de movimentos clônicos. Apresenta saturação de 91%. Ao exame, observa-se panículo adiposo escasso, tetraparesia espástica e hipotrofia muscular global.

Considerando esse caso clínico, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Nos primeiros cinco minutos, deve-se realizar um exame clínico sucinto e fornecer oxigênio suplementar.
- () O medicamento de escolha a ser utilizado do sexto ao décimo quinto minuto para abordar a crise convulsiva é o fenobarbital.
- () Nos casos refratários, pode-se tentar fazer uso de cetamina contínua.
- () O ácido valproico somente deve ser iniciado como medicamento de manutenção após o quadro ter sido totalmente controlado.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 34

Analise as seguintes afirmativas sobre doença reumática na infância e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A coreia é prevalente em indivíduos do sexo masculino, enquanto a cardiopatia é prevalente nos indivíduos do sexo feminino.
- () A duração da fase aguda varia de 6 a 12 semanas.
- () O intervalo PR prolongado no eletrocardiograma é um dos critérios maiores de Jones para realizar o diagnóstico.
- () A insuficiência mitral é a lesão mais frequente, seguida pela insuficiência aórtica, isolada ou associada à valvite mitral.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 35

Sobre a varicela, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Não acomete as mucosas e atinge principalmente áreas expostas.
- B) A idade mais comum de acometimento é entre 1 e 14 anos.
- C) A morfologia da lesão é de uma mácula vesicular que evolui para crosta.
- D) Pode cursar com febre, prurido e adenomegalia.

QUESTÃO 36

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de 3 anos de idade, sexo feminino, foi submetida a cirurgia para correção de defeito do septo atrioventricular aos seis meses de vida. Apresentou um quadro de alteração do nível de consciência e palidez. Ao exame, apresenta-se taquidispneia, taquicárdica, hipotensa, enchimento capilar lento. Feita monitorização cardíaca e observada taquicardia com QRS estreito.

Considerando esse caso clínico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nesse quadro, possivelmente inexitem ondas P, e a frequência cardíaca deve estar acima de 180 batimentos por minuto.
- B) Pode-se utilizar cardioversão elétrica sincronizada.
- C) Pode-se considerar o tratamento com manobras vagais se não for postergar o tratamento mais efetivo.
- D) Deve ser tentada inicialmente a cardioversão com amiodarona.

QUESTÃO 37

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de seis anos de idade, sexo feminino, foi internada devido a quadro pneumonia e asma com insuficiência respiratória, gasometria com PCO_2 de 65 mm Hg e PO_2 de 40 mm Hg.

Considerando esse quadro clínico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Devem ser adotadas medidas de pré-oxigenação e não é necessário realizar pré-medicação.
- B) O bloqueador neuromuscular de escolha é o suxametônio.
- C) Deve-se puncionar um acesso venoso seguro.
- D) O melhor medicamento para analgesia é o fentanil, pois ajuda no quadro ventilatório da doença de base.

QUESTÃO 38

Sobre as infecções respiratórias agudas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de rinorreia purulenta pode ser indicativo da fase final das rinites virais.
- B) A maioria dos casos de laringites é causada por agentes bacterianos, principalmente por estreptococos e por hemófilos.
- C) O adenovírus provoca faringoamigdalite mais prolongada, com exsudato amigdaliano e sintomas mais intensos que as faringoamigdalites virais, estando inclusive associado com conjuntivite.
- D) A gengivoestomatite herpética se manifesta pela presença de vesículas e úlceras em palato, gengivas e lábios, ocasionando odinofagia.

QUESTÃO 39

Sobre a fibrose cística, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve-se suspeitar nos casos de íleo meconial, pneumopatias crônicas, diarreia crônica, desnutrição, déficits de crescimento, distúrbios hidroeletrólíticos ou isolamento casual de *P. aeruginosa* em secreções respiratórias.
- B) O prolapso retal ocorre em até 20% dos pacientes fibrocísticos com idade entre 6 e 36 meses com insuficiência pancreática.
- C) A manifestação respiratória mais comum é as bronquiectasias.
- D) O teste do suor tem elevada sensibilidade e especificidade, baixo custo e não é invasivo.

QUESTÃO 40

Associe a COLUNA I com a COLUNA II, relacionando os sinais de alerta do desenvolvimento infantil à época em que podem ser identificados.

COLUNA I

- 1. Ao final do primeiro trimestre
- 2. Ao final do primeiro semestre
- 3. Aos 9 meses
- 4. Aos 12 meses

COLUNA II

- () Hipotonia do tronco (não senta sem apoio), hipotonia ou espasticidade dos membros inferiores, mãos fechadas persistentemente, ausência de preensão em pinça, incapacidade de localizar sons, ausência de balbucio, sorriso social pobre, desinteresse no jogo esconde-achou.
- () Controle deficiente da cabeça, rigidez dos membros inferiores, lentidão dos movimentos, não reage e não vira a cabeça para localizar sons, movimentos bruscos (descarga motora) e não dá risada.
- () Criança parada, movimentos anormais, ausência de sinergia pés-mãos, cessação do balbucio e não fala sílabas, irritação, inércia, sorriso social pobre.
- () Olhar vago, ausência do sorriso social e de reações a ruídos fortes, sobressalto ao menor ruído, mãos fechadas persistentemente.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 4 1
- B) 4 2 3 1
- C) 4 3 2 1
- D) 3 1 2 4

QUESTÃO 41

Sobre o desenvolvimento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No Brasil, o *Haemophilus influenzae* tipo B foi a principal causa de meningite bacteriana até 1999.
- B) Se houver sinais de hipertensão intracraniana, papiledema ou sinais neurológicos focais, há indicação de realização de tomografia computadorizada cerebral, antes da punção lombar.
- C) No recém-nascido acometido com meningite, ocorre abaulamento da fontanela em cerca de 90% dos casos.
- D) A quimioprofilaxia para meningococos deve ser feita em contatos domiciliares ou que compartilhem alojamentos (creches, orfanatos, etc.) com 20 horas de convivência com o caso-índice nos últimos sete dias.

QUESTÃO 42

Sobre as encefalites, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Podem ser divididas em primárias, causadas por agentes infecciosos, e em secundárias, por reações imunológicas.
- B) Os arbovírus e o micoplasma podem desencadear encefalites.
- C) O eletroencefalograma apesar de específico não é relevante, uma vez que não avalia a disfunção cerebral de forma precoce.
- D) A ressonância nuclear magnética é o exame imaginológico mais sensível e mais específico; entretanto, um exame normal não exclui o diagnóstico.

QUESTÃO 43

Sobre a tuberculose na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A transmissão da doença é feita por meio da eliminação de partículas em aerossol, que contém de um a três bacilos – núcleo de Wells.
- B) A tuberculose pulmonar na criança ocorre de forma quase sempre sintomática com febre, tosse e perda de peso.
- C) A meningoencefalite tuberculosa decorre da disseminação hematogênica, podendo ocorrer em associação com a forma miliar em 30% dos casos.
- D) O teste tuberculínico maior que 5 mm determina o paciente que é reator.

QUESTÃO 44

Sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O vírus HIV infecta células do sistema imune que expressam CD4, como linfócitos T-auxiliares, macrófagos e células dendríticas.
- B) Em torno de 10 a 15% das crianças, seguem padrão evolutivo lento em que predominam sintomas linfoproliferativos.
- C) A imaturidade do sistema imune à época da infecção é possivelmente o determinante da evolução mais rápida da infecção em crianças.
- D) Em crianças abaixo de 12 meses de idade, recomenda-se o início do tratamento antirretroviral independentemente de sintomatologia clínica ou qualquer parâmetro laboratorial.

QUESTÃO 45

Sobre as cefaleias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Cefaleias crônicas e progressivas se caracterizam por aumento na frequência e na intensidade, sugerindo hipertensão intracraniana.
- B) Na aura migranosa, a cefaleia começa durante a aura ou menos de uma hora após o seu término.
- C) Na profilaxia medicamentosa da migrânea, o efeito placebo pode chegar a 50% e, assim, reduzir o uso abusivo de analgésicos.
- D) A migrânea abdominal é a ocorrência obrigatória de mais de 10 episódios de crises de dores abdominais com duração de até 36 horas.

QUESTÃO 46

Sobre a criança com baixo peso ao nascer e a criança prematura, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O recém-nascido com baixo peso ao nascer apresenta uma morbimortalidade maior do que o recém-nascido com peso adequado.
- B) A prematuridade é fator de risco para retinopatia.
- C) O recém-nascido de baixo peso é aquele que apresenta um peso menor do que 2 000 gramas, independentemente da idade gestacional.
- D) O prematuro está mais sujeito a apresentar hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnesemia do que o recém-nascido a termo.

QUESTÃO 47

Sobre a otite média aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A otite média com efusão deve ser sempre tratada com antibióticos.
- B) É a afecção mais frequente da infância, depois do resfriado comum.
- C) A disfunção da tuba auditiva pode ser considerada o fator primordial na gênese da otite média.
- D) A miringotomia com aspiração da efusão do ouvido médio é o procedimento mais utilizado quando o tratamento clínico não surte efeito satisfatório.

QUESTÃO 48

Sobre a desidratação aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A desidratação moderada se manifesta por sinais evidentes, como: sede, secura das mucosas, turgor pastoso, elasticidade de pele diminuída e taquicardia, apesar das condições circulatórias estarem estáveis.
- B) A obesidade faz com que as alterações do turgor e elasticidade da pele se façam de modo tardio.
- C) Na desidratação por diarreia, a alteração mais frequente é a acidose metabólica que decorre principalmente da perda de bicarbonato nas fezes.
- D) A desidratação hiponatrêmica é mais comum em crianças de baixa idade do que nas maiores.

QUESTÃO 49

Sobre a sinusite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O *Staphylococcus aureus* é um agente bastante comum nas sinusites agudas.
- B) A rinosinusite crônica apresenta sintomas como tosse, rinorreia e obstrução nasal com duração superior a três meses.
- C) Em 80% dos casos, a sinusite ocorre após infecção de vias aéreas de etiologia viral.
- D) Como apresentação clínica de suspeição, pode-se observar sinais e sintomas de resfriado que persistem por mais de 10 dias com qualquer tipo de rinorreia e tosse que piora à noite.

QUESTÃO 50

Sobre a hipertensão arterial na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O valor de PA sistólica e diastólica encontra-se normal quando inferior ao valor do percentil 90 para idade, sexo e percentil de estatura.
- B) A urgência hipertensiva caracteriza-se por descompensação rápida de funções vitais, causada por grande elevação da PA em presença de lesão evidente e recente de órgãos-alvo.
- C) A prevalência de doença renovascular na hipertensão pediátrica é estimada em 3 a 5%.
- D) No tratamento medicamentoso, considera-se aceitável a introdução das seguintes classes de medicamentos anti-hipertensivos: inibidores da enzima de conversão da angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina, betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e diuréticos.

QUESTÃO 51

Sobre a infecção do trato urinário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A taxa de recorrência é elevada: 30% das meninas têm um novo episódio dentro do primeiro ano após o episódio inicial.
- B) Nos lactentes, a febre é a principal manifestação e, muitas vezes, é o único sinal de ITU.
- C) A presença de vulvovaginite ou de balanopostite pode levar a um quadro laboratorial falso-positivo de ITU.
- D) A presença de pH urinário ácido pode acontecer em decorrência de infecção pelo *Proteus*, que possui a habilidade de desdobrar a amônia.

QUESTÃO 52

Sobre a glomerulonefrite difusa aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A tríade característica é composta por edema, hipertensão arterial e hematuria.
- B) O complemento sérico C3 é muito importante para confirmar o diagnóstico e encontra-se aumentado em 95% dos casos.
- C) Os hipotensores somente serão utilizados nos casos em que há desaparecimento do edema e da oligúria, sem o desaparecimento da hipertensão.
- D) A biopsia renal deve ser realizada em casos atípicos, como anúria por mais de 72h.

QUESTÃO 53

Sobre a síndrome nefrótica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os níveis séricos do colesterol total, triglicérides e lipoproteínas acham-se diminuídos.
- B) A constatação de hipocomplementemia persistente é indicação formal para biópsia renal.
- C) A resposta à corticoterapia é um marco importante na resposta terapêutica, estratificando-se didaticamente em corticossensíveis e corticorresistentes.
- D) A principal causa de óbito era os processos infecciosos, reduzidos com uso de antibióticos; entretanto, as infecções continuam sendo de grande risco, pois desencadeiam e mantêm as crises.

QUESTÃO 54

Sobre a sexualidade na adolescência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os adolescentes do sexo feminino demonstram maior insatisfação com o seu corpo e maior representação negativa dele do que os adolescentes do sexo masculino.
- B) Para Freud, os indivíduos passam por cinco estágios psicosssexuais: oral, anal, fálico, de latência e genital.
- C) Segundo Erikson, o indivíduo passa por quatro estágios do desenvolvimento: sensório-motor (nascimento aos dois anos), pré-operacional (dois a sete anos), operacional concreto (7 a 11 anos) e operacional formal (a partir de 11 anos).
- D) No sexo feminino, embora exista a relação hormonal entre andrógeno e atividade sexual, a atividade sexual parece receber maior influência socioambiental (comportamento das amigas) do que hormonal.

QUESTÃO 55

Sobre a constipação intestinal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Dentre as causas de constipação crônica na infância, citam-se hipotireoidismo, fibrose cística, hipercalcemia e hipocalcemia.
- B) A constipação crônica é definida de modo arbitrário quando o sintoma está presente de forma contínua por mais de 6 semanas.
- C) O enema opaco é útil para avaliar dilatação de segmentos colônicos secundária à retenção fecal contínua, que origina cólon sigmoide redundante, megacólon ou megarreto.
- D) O tratamento inicial é feito por meio de 4 importantes fases: mudança comportamental, desimpactação fecal, prevenção de retenção das fezes e seguimento.

QUESTÃO 56

Sobre as convulsões febris (CF), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pode-se realizar a profilaxia das CF utilizando-se do fenobarbital no início do ciclo de febre e mantido por dois dias.
- B) A persistência de CF após os 6 anos, associada ou não à crise afebril, com remissão espontânea em torno dos 12 anos, configura uma situação de forte componente familiar denominada convulsão febril *plus*.
- C) Lactentes que apresentem a primeira CF, mesmo na ausência de sinais de irritação meníngea, devem realizar exame do líquido cefalorraquidiano.
- D) A CF apresenta caráter familiar quando da sua apresentação.

QUESTÃO 57

Sobre o tabagismo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O fumante passivo aumenta o seu risco de hospitalização por problemas de vias aéreas em 4 vezes, de broncopneumonias em 2 vezes e faringites em 1,5 vez.
- B) Alimentos contendo betacaroteno protegem contra os males do cigarro.
- C) Dos 15 anos de idade em diante, 30 a 35% dos jovens estarão fumando.
- D) É o mais mortal dos fatores de risco evitáveis para doenças cardiovasculares, oncológicas e pulmonares.

QUESTÃO 58

Associe a COLUNA I com a COLUNA II, relacionando as vitaminas com suas respectivas deficiências.

COLUNA I

- 1. Vitamina D
- 2. Vitamina C
- 3. Vitamina E
- 4. Vitamina B2

COLUNA II

- () Estomatite angular
- () Sinal do anel de Wimberger
- () Ataxia
- () Paratormônio elevado

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 4 1
- B) 4 2 3 1
- C) 4 3 2 1
- D) 3 1 2 4

QUESTÃO 59

Sobre a constipação intestinal na infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O pico de incidência é entre dois e quatro anos de idade.
- B) A aganglionose congênita pode ser causa de constipação intestinal.
- C) A incontínência fecal retentiva é caracterizada pela eliminação involuntária de fezes de consistência endurecida nas roupas íntimas após dois anos de idade.
- D) A desimpactação retal está indicada após relato de fecaloma ao exame do abdômen, ao toque retal ou na radiografia simples do abdômen, podendo ser feita por via oral ou retal.

QUESTÃO 60

Sobre as pneumonias comunitárias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As radiografias de tórax permanecem como padrão-ouro para diagnóstico; no entanto, o seu papel no diagnóstico diferencial da etiologia tem sido bastante impreciso.
- B) Para as crianças com idade abaixo de 2 meses de vida, o tratamento inicial será sempre sob regime de internação hospitalar.
- C) Os pacientes, que podem ser tratados ambulatoriamente, devem ser reavaliados nas primeiras 48h de tratamento.
- D) Na suspeita de infecção por *C. trachomatis*, emprega-se o uso de ampicilina em dose alta por 7 dias.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D	41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D	42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D	43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D	44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D	45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D	46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D	47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D	48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D	49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D	50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D	51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D	52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D	53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D	54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D	55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D	56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D	57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D	58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D	59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D	60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**